

(PDF) Perasolic là thuốc gì? Có tốt không? Lừa Đảo? Giá bao nhiêu? Thành phần? Chữa bệnh gì?

Trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị các bệnh lý da liễu, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp luôn là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân nhanh chóng cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các bệnh ngoài da như viêm da, vẩy nến, eczema, tổ đỉa hay mụn cơm không chỉ gây ra các triệu chứng khó chịu như ngứa ngáy, viêm sưng mà còn ảnh hưởng lớn đến ngoại hình và tâm lý người bệnh. Trước những thách thức đó, thuốc bôi ngoài da **Perasolic** đã trở thành một lựa chọn phổ biến và hiệu quả trong việc kiểm soát các bệnh da mãn tính này.

Với sự kết hợp của hai thành phần chính có tác dụng điều trị đặc hiệu là Acid salicylic và Betamethason dipropionat, Perasolic không chỉ giúp giảm viêm, giảm ngứa mà còn làm mềm và loại bỏ các lớp da chết, góp phần cải thiện nhanh chóng tình trạng da tổn thương. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về công dụng, thành phần, cách sử dụng, cũng như các lưu ý quan trọng khi dùng thuốc Perasolic, giúp người bệnh có cái nhìn toàn diện và an tâm hơn trong quá trình điều trị các bệnh ngoài da.



Perasolic là thuốc gì?

Perasolic là một loại thuốc mỡ bôi ngoài da, thuộc nhóm thuốc kê đơn, được sử dụng phổ biến trong điều trị các bệnh lý da liễu có tính chất viêm mạn tính, tái phát và dai dẳng như vẩy nến, eczema, tổ đỉa, viêm da dị ứng, viêm da thần kinh và các tình trạng dày sừng, khô da khác. Với công thức phối hợp giữa hai hoạt chất có tác dụng đặc hiệu là **Betamethason dipropionat** – một corticosteroid tổng hợp có tác dụng chống viêm, giảm ngứa và dị ứng mạnh – và **Acid salicylic** – một chất tiêu sừng, làm mềm và bong lớp da chết – Perasolic vừa giúp điều trị triệu chứng vừa cải thiện nền da bị tổn thương, đặc biệt hiệu quả ở các trường hợp có biểu hiện da dày sừng và khô, dai dẳng, khó lành. Betamethason dipropionat có khả năng ức chế phản ứng viêm, làm giảm sự di chuyển của bạch cầu đa nhân, ngăn chặn hoạt động của các chất trung gian hóa học gây viêm, nhờ đó làm giảm rõ rệt hiện tượng sưng đỏ, ngứa rát trên bề mặt da. Trong khi đó, Acid salicylic có vai trò làm mềm lớp sừng, hỗ trợ bong tróc các tế bào chết, giảm tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo điều kiện thuận lợi để Betamethason thẩm thấu sâu vào da, phát huy tối đa hiệu lực điều trị.

Thuốc **Perasolic** được bào chế dưới dạng thuốc mỡ, đóng gói trong tuýp 15g tiện dụng, sử dụng bằng cách bôi trực tiếp lên vùng da bị tổn thương, sau khi đã được làm sạch và lau khô. Người bệnh chỉ cần lấy một lượng thuốc vừa đủ, thoa đều và nhẹ nhàng lên da, thông thường ngày bôi hai lần, sáng và tối. Không nên băng kín vùng da bôi thuốc vì điều này có thể làm tăng hấp thu toàn thân của corticosteroid, dễ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Tác dụng điều trị của thuốc có thể thấy rõ sau vài ngày sử dụng, tuy nhiên người bệnh cần tuân thủ đúng liều lượng và thời gian điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý dùng kéo dài vì có thể gây mỏng da, giãn mao mạch, rối loạn sắc tố da hoặc ức chế hoạt động của tuyến thượng thận.

Xem thêm:

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-vitafit.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-prostanix.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2609?penirum-a>

<https://bvdkht.vn/feedback/2666/penirum-a-gia-bao-nhieu.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2613/glucoactive-co-tot-khong.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2609?diafinol>

<https://bvdkht.vn/feedback/2609/vitafit-co-tot-khong.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-lipixgo.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3614&movefix-long-chau-gia-bao-nhieu-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-mua-o-dau-chinh-hang-thanh-phan.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-movefix.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2709/penirum-a-co-tot-khong.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2668/vitafit-la-thuoc-gi-gia-bao-nhieu.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2710/lipixgo-gia-bao-nhieu.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2612/penirum-a-co-tac-dung-gi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2690/thuoc-penirum-a.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2690/lipixgo-la-thuoc-gi.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&vitafit>

<https://bvdkht.vn/feedback/2690/movefix-la-thuoc-gi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2689/lipixgo-co-tot-khong.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&movefix>

<https://bvdkht.vn/feedback/2667/movefix-gia-bao-nhieu.html>

Chỉ định thuốc Perasolic

Chỉ định chính của thuốc bao gồm: điều trị vảy nến (đặc biệt là vảy nến thể mảng), viêm da dị ứng mạn tính, tổ đỉa (một dạng viêm da gây nổi mụn nước sâu dưới da), eczema, viêm da thần kinh (lichen simplex), viêm da tiết bã, bệnh vẩy cá, lichen phẳng và mụn cơm. Những bệnh lý này không chỉ gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy kéo dài mà còn ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong nhiều trường hợp, việc điều trị bằng Perasolic giúp kiểm soát triệu chứng nhanh chóng, giảm thời gian tái phát, đồng thời cải thiện rõ rệt tính thẩm mỹ cho vùng da bị tổn thương.

Về **thành phần**, mỗi tuýp Perasolic 15g chứa 7,5mg Betamethason dưới dạng dipropionat (tương đương 9,6mg Betamethason dipropionat), 450mg Acid salicylic, cùng với các tá dược như vaseline, paraffin wax, propylene glycol, sáp ong trắng, cetyl stearyl alcohol... giúp tạo nền thuốc ổn định, mềm mịn và dễ thẩm thấu vào da.

Thuốc được sản xuất bởi **Công ty TNHH US Pharma USA – Việt Nam**, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM, và đã được **Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế** cấp phép lưu hành với số đăng ký **VD-26033-16**.

Tác dụng phụ thuốc Perasolic

Trong quá trình sử dụng, **tác dụng phụ** có thể xảy ra bao gồm khô da, ngứa rát, nổi mụn, viêm nang lông, rậm lông cục bộ, thay đổi sắc tố da, viêm da tiếp xúc, viêm da quanh miệng và các biểu hiện teo da nếu dùng dài ngày hoặc trên diện rộng. Với trẻ nhỏ, người có làn da mỏng yếu, hoặc phụ nữ có thai và cho con bú, cần thận trọng khi sử dụng thuốc. Không có

dữ liệu đầy đủ về mức độ an toàn khi sử dụng Perasolic cho thai phụ hoặc phụ nữ cho con bú, vì vậy nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Ngoài ra, thuốc không được dùng trong các trường hợp nhiễm virus như zona, herpes, thủy đậu, hay viêm da có nhiễm trùng chưa kiểm soát. Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc cũng không được sử dụng.

Quá liều và quên liều thuốc Perasolic

Trong trường hợp **quá liều**, đặc biệt khi bôi thuốc diện rộng, kéo dài hoặc băng ép, người bệnh có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như hội chứng Cushing, suy tuyến thượng thận, hoặc ngộ độc salicylate với biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, thậm chí hoại tử da. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần ngừng thuốc ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Ngược lại, nếu **quên liều**, hãy bôi lại ngay khi nhớ ra, nhưng nếu đã gần thời điểm bôi liều tiếp theo thì chỉ cần tiếp tục như bình thường, không nên bôi gấp đôi để bù liều đã quên.

Tìm hiểu thêm:

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3617&thuoc-movefix.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=338&diafinol-vn-la-thuoc-gi-co-tot-khong-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-chinh-hang-long-chau.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2612/parasotic-co-tot-khong.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3614&thuoc-diafinol-tieu-duong-co-tot-khong.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-ecoclean.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3613&thuoc-penirum-a-co-tot-khong-la-thuoc-gi-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-chinh-hang.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2666/ecoclean-la-thuoc-gi.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&movefix>

<https://bvdkht.vn/feedback/2669/parasotic-la-thuoc-gi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2673/thuoc-parasotic.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=338&truong-xuan-vuong-chinh-hang-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-bac-si-nguyen-huu-trong-co-tac-dung-gi-lu-a-dao-long-chau-1-hop-bao-nhieu-vien-co-tot-khong>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3613&herbal-glucoacti-ve-vn-la-thuoc-gi.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3616&truong-xuan-vuong-long-chau-la-thuoc-gi-gia-bao-nhieu-chinh-hang-mua-o-dau-bac-si-nguyen-huu-trong>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&thuoc-truong-xuan-vuong-chinh-hang.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=338&movefix-la-thuoc-gi-co-tot-khong-gia-bao-nhieu-mua-o-dau-chinh-hang.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=3613&prostanix-vn-la-thuoc-gi-gia-bao-nhieu-long-chau-co-tac-dung-gi-ho-tro-tuyen-tien-liet.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=338&thuoc-prostanix-vn-long-chau-gia-bao-nhieu-co-tac-dung-gi.html>

Perasolic giá bao nhiêu? Mua ở đâu?

Một điểm đáng lưu ý là hiện nay **Perasolic được bán trên thị trường với giá khá phải chăng**, dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng/tuýp tùy vào nhà thuốc và khu vực. Tuy nhiên, do là thuốc kê đơn, người bệnh cần có đơn từ bác sĩ để được hướng dẫn dùng đúng bệnh, đúng liều, tránh tự ý mua và sử dụng để hạn chế rủi ro.

Perasolic có thể mua tại các nhà thuốc tư nhân, hiệu thuốc bệnh viện hoặc đặt mua qua các nền tảng dược phẩm chính thống.

Cách sử dụng thuốc Perasolic

Thuốc Perasolic được bào chế dưới dạng thuốc mỡ, dùng để bôi ngoài da nên tuyệt đối không được uống hoặc thoa lên niêm mạc mắt. Trước khi sử dụng, người bệnh cần vệ sinh sạch sẽ vùng da cần điều trị bằng nước sạch, sau đó lau khô nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương da hoặc gây nhiễm trùng. Khi bôi thuốc, lấy một lượng vừa đủ, thoa đều lên vùng da bị tổn thương hoặc viêm nhiễm, tránh thoa quá nhiều thuốc để không gây hấp thu corticoid vượt mức, dễ dẫn đến tác dụng phụ.

Nên sử dụng thuốc Perasolic ngày hai lần, tốt nhất là vào buổi sáng và buổi tối để đảm bảo thuốc thẩm thấu đều và phát huy hiệu quả tối ưu. Sau khi bôi thuốc, không nên băng ép vùng da vừa thoa nhằm hạn chế việc thuốc hấp thu vào máu quá nhiều, đồng thời tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đối với những trường hợp da quá dày sừng hoặc bong tróc nhiều, việc duy trì sử dụng liên tục theo đúng chỉ định của bác sĩ là rất quan trọng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Người dùng cần lưu ý không dùng thuốc cho các vùng da rộng hoặc liên tục trong thời gian dài mà không có chỉ định từ bác sĩ, bởi thuốc chứa corticoid có thể gây ra những tác dụng phụ như mỏng da, giãn mạch, thay đổi sắc tố hoặc suy tuyến thượng thận nếu sử dụng không đúng cách. Trong quá trình điều trị, nếu xuất hiện các dấu hiệu kích ứng nặng như đỏ rát, phát ban, mụn mủ, hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác, người bệnh nên

ngưng sử dụng thuốc và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức để được tư vấn và điều chỉnh liều lượng phù hợp.

Đặc biệt, với trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, việc sử dụng Perasolic cần có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên môn để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người bệnh cũng nên bảo quản thuốc nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao để giữ nguyên chất lượng thuốc trong suốt thời gian sử dụng.

Tóm lại, Perasolic là một loại thuốc bôi ngoài da có tác dụng điều trị hiệu quả các bệnh lý da viêm mạn tính nhờ sự kết hợp giữa Betamethason dipropionat và Acid salicylic. Sản phẩm mang lại cải thiện nhanh chóng về triệu chứng ngứa, viêm, sừng hóa, giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh tốt hơn, đồng thời hạn chế tái phát khi dùng đúng cách. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng và tuyệt đối tuân theo chỉ định y khoa, đặc biệt khi sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc vùng da nhạy cảm. Sử dụng thuốc đúng liều, đúng thời gian không chỉ giúp tối ưu hiệu quả điều trị mà còn tránh được các biến chứng do corticoid gây ra khi dùng không hợp lý.

Top các bài viết sức khỏe hay:

<https://bvdkht.vn/feedback/2609/diafinol-co-tot-khong.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-diafinol.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2613/cong-dung-cua-thuoc-diafinol.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2560/diafinol-gia-bao-nhieu.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2666/diafinol-mua-o-dau.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&lipofil.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2500/varilin.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2611/thuoc-lipofil.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2609?lipofil-co-tot-khong>

<https://bvdkht.vn/feedback/2501/lipofil-gia-bao-nhieu.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2561/lipofil-co-tac-dung-gi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2563/lipofil-mua-o-dau.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2612/diafinol-la-thuoc-gi.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2667/diafinol-thanh-phan-cong-dung-cach-dung.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2500/lipofil.html>

<https://bvdkht.vn/feedback/2668/thuoc-tieu-duong-diafinol-vn.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=331&diafinol>

<https://bvdkht.vn/feedback/2560/lipofil-la-thuoc-gi.html>

<https://syt.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=158&lipofil-la-thuoc-gi.html>